

Gebrauchsinformation, bitte aufmerksam lesen!**Anaesthesin® -Pastillen****Anaesthesin® N Pastillen forte****Zusammensetzung:**

arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 Pastille enthält 8mg Benzocain (Anaesthesin® -Pastillen)

1 Pastille enthält 15mg Benzocain (Anaesthesin® -N Pastillen forte)

sonstige Bestandteile: Gelatine, Maltitol, Natriumchlorid, Saccharin-Natrium, Miglyol, dünnflüssiges Paraffin, gebleichtes Wachs, Pfefferminzöl, Anisöl, Cochenille-Rot E 124

Darreichungsform und Packungsgröße:

Pastillen in Packungen zu 20 Stück

Stoff- und Indikationsgruppe:

Mund- und Rachentherapeutika

Dr. E. Ritsert, Arzneimittel, Klausenweg 12, 69412 Eberbach

Anwendungsgebiete (Anaesthesin® -Pastillen, Anaesthesin® N Pastillen forte):

Zur unterstützenden, symptomatischen Behandlung von schmerzhaften Beschwerden im Mund- und Rachenraum.

Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Benzocain.

Bei Überempfindlichkeit gegenüber Parabenen mögliche Kreuzallergie beachten.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Dosierung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, lutschen Erwachsene und Kinder mehrmals täglich 1 - 2 Pastillen.

Nebenwirkungen:

In seltenen Fällen kann es zu einer Überempfindlichkeitsreaktion kommen.

Das Arzneimittel sollte nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Stand der Information:

Mai 2001

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Anaesthesin® –Entdecker: Dr. E. Ritsert. ® = reg. Warenzeichen der Hoechst AG