

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen beachten?
3. Wie sind Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was sind Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen und wofür werden sie angewendet?

Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen sind ein Antiallergikum/Antihistaminikum. Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen werden angewendet zur Behandlung und Vorbeugung der Symptome der saisonalen allergisch bedingten Beschwerden der Augen (allergische Bindehautentzündung, sog. allergische Konjunktivitis, bei Heuschnupfen) bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren. (Saisonale Allergien sind zum Beispiel durch Pollen von Bäumen oder Gräsern ausgelöste Allergien, die zeitlich begrenzt auftreten.)

Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen werden außerdem angewendet zur Behandlung der Symptome der nicht-saisonalen (perennialen) allergisch bedingten Beschwerden der Augen (allergischer Bindehautentzündung, sog. allergische Konjunktivitis) bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren. (Nicht-saisonale Allergien sind zum Beispiel durch Hausstaub, Tierhaare oder Schimmelpilze ausgelöste Allergien, die das ganze Jahr über zeitlich unbegrenzt auftreten können.)

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen beachten?

Wann dürfen Sie Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen nicht anwenden?

Sie dürfen Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen nicht anwenden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem Wirkstoff Azelastinhydrochlorid, dem Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid oder einem anderen der sonstigen Bestandteile von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen reagieren.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen sollten bei saisonalen allergisch bedingten Beschwerden frühestens bei Kindern ab 4 Jahren angewendet werden, bei nicht-saisonalen (perennialen) allergisch bedingten Beschwerden frühestens bei Kindern ab 12 Jahren.

Was ist bei älteren Menschen zu berücksichtigen?

Für ältere Patienten sind keine besonderen Hinweise zu beachten.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen sind nicht zur Behandlung von Infektionen am Auge geeignet.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn sich die Symptome trotz Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen verschlimmern oder länger als 48 Stunden anhalten. Während der Behandlung mit Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen sollten keine Kontaktlinsen getragen werden. Weiche Kontaktlinsen werden durch das Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid verfärbt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel und Nahrungsmittel beeinflussen die Wirkung von Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen?

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und Nahrungsmitteln sind bisher nicht beobachtet worden.

Schwangerschaft und Stillzeit

In der Schwangerschaft sollten Sie vor der Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen den Arzt befragen.

Da der Wirkstoff in geringem Ausmaß in die Muttermilch ausgeschieden wird, sollten Sie Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen während der Stillzeit nicht anwenden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es ist unwahrscheinlich, dass die leichte vorübergehende Irritation, die nach Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen auftreten kann, zu einer stärkeren Beeinträchtigung der Sicht führt. Sollte es zu einer kurzzeitigen Beeinträchtigung der Sicht kommen, sollten Sie warten, bis diese vorüber ist, bevor Sie am Straßenverkehr teilnehmen oder Maschinen bedienen.

3. Wie sind Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen anzuwenden?

Wenden Sie Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Saisonale allergische Konjunktivitis:

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, sollen Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren 2-mal täglich je 1 Tropfen Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen in jedes Auge einträufeln. Falls erforderlich, kann diese Dosis auf 4-mal täglich je 1 Tropfen pro Auge erhöht werden.

Bei zu erwartendem Kontakt mit Allergenen können Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen auch vorbeugend angewendet werden.

Nicht-saisonale (perenniale) allergische Konjunktivitis:

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, sollen Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 2-mal täglich je 1 Tropfen Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen in jedes Auge einträufeln. Falls erforderlich, kann diese Dosis auf 4-mal täglich je 1 Tropfen pro Auge erhöht werden.

Wie sollten Sie Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen anwenden?

Nehmen Sie ein sauberes Papiertaschentuch und entfernen Sie die Tränenflüssigkeit vom unteren Lidrand (s. Abb. 1).

Schrauben Sie die Flasche auf.

Legen Sie den Kopf etwas zurück, ziehen Sie das Unterlid leicht vom Auge ab (s. Abb. 2) und träufeln Sie vorsichtig einen Tropfen in den Bindehautsack (s. Abb. 3).

Achten Sie dabei darauf, dass die Tropferspitze das Auge nicht berührt.

Lassen Sie das untere Augenlid wieder los und pressen Sie vom Augenwinkel aus leicht gegen die Nase (s. Abb. 4). Blinzeln Sie mehrmals langsam, um den Tropfen über den Augapfel zu verteilen. Entfernen Sie anschließend überschüssige Augentropfen.

Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Auge.



Abbildung 1



Abbildung 2




Abbildung 3



Abbildung 4

Wie lange sollten Sie Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen anwenden?

Sie sollten auch nach dem Abklingen der Beschwerden die Behandlung mit Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen so lange fortführen, wie Sie den Allergie auslösenden Substanzen (z. B. Pollen, Hausstaub) ausgesetzt sind.

Bei nicht-saisonal (perennial) allergischer Konjunktivitis sollte die ununterbrochene Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen auf maximal 6 Wochen begrenzt werden, weil die Sicherheit und Verträglichkeit des Arzneimittels in klinischen Studien nur bis zu 6 Wochen untersucht wurde.

Eine Anwendung über 6 Wochen hinaus darf auch bei saisonaler allergischen Konjunktivitis nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen angewendet haben, als Sie sollten

Nach Anwendung am Auge sind keine spezifischen Überdosierungsreaktionen bekannt und bei dieser Art der Anwendung auch nicht zu erwarten.

Wenn Sie die Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen vergessen haben

Sollten Sie einmal die Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen vergessen haben, sind keine speziellen Maßnahmen erforderlich. Setzen Sie die Therapie mit der gleichen Dosierung zum nächsten vorgesehenen Zeitpunkt fort. Bei Bedarf können Sie Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen auch zwischen zwei vorgesehenen Zeitpunkten anwenden.

Wenn Sie die Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen abbrechen

Die Behandlung mit Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen sollte nach Möglichkeit regelmäßig, bis zum Erreichen der Beschwerdefreiheit erfolgen.

Sollten Sie die Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen unterbrechen, obwohl Sie den Allergie auslösenden Substanzen noch ausgesetzt sind, so müssen Sie damit rechnen, dass sich die typischen allergischen Symptome erneut zeigen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden üblicherweise folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

Bedeutsame Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:

Gelegentlich kommt es unmittelbar nach Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen vorübergehend zu leichten Reizerscheinungen (z. B. Brennen, Jucken, Tränen) am Auge. Selten wird ein leicht bitterer, substanz eigener Geschmack wahrgenommen.

In sehr seltenen Fällen kann es zu allergischen Reaktionen kommen.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Wenn Sie von einer der oben genannten Nebenwirkungen betroffen sind, wenden Sie Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen nicht weiter an und suchen Sie Ihren Arzt möglichst umgehend auf.

Die genannten Nebenwirkungen klingen in der Regel rasch wieder ab. Besondere Gegenmaßnahmen sind deshalb nicht erforderlich.

Sollten Sie nach der Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen einen bitteren Geschmack verspüren, so können Sie diesem mit einem alkoholfreien Getränk (z. B. Saft, Wasser) entgegenwirken.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben ist.

5. Wie sind Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen aufzubewahren?

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren!

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel sowie auf dem Etikett der Flasche aufgedruckt. Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen sollten nach diesem Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden.

Aufbewahrungsbedingungen

Keine besonderen Hinweise erforderlich.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Verwenden Sie Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen nach Anbruch nicht länger als 4 Wochen.

6. Weitere Informationen

Was Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen enthalten:

Der Wirkstoff ist Azelastinhydrochlorid.

(1 ml Lösung enthält 0,5 mg Azelastinhydrochlorid. Ein Tropfen von ca. 30 µl enthält 0,015 mg Azelastinhydrochlorid.)

Die sonstigen Bestandteile sind: Benzalkoniumchlorid (Konservierungsmittel); Natriumedetat (Ph.Eur.); Hypromellose; Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph.Eur.); Natriumhydroxid und Wasser für Injektionszwecke.

Es sind Packungen mit 6 ml Augentropfen (Lösung) je Tropfflasche erhältlich.

Pharmazeutische Unternehmer: (*)

Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165 -173
13581 Berlin
Tel.: 030/33093-0
E-Mail: heuschnupfen@bausch.com
und Bausch & Lomb GmbH
Brunsbütteler Damm 165 -173
13581 Berlin
Tel.: 030/33093-0
E-Mail: heuschnupfen@bausch.com

Hersteller:

MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstraße 1
61352 Bad Homburg
Telefon: (06172) 888-01
Telefax: (06172) 888-2740

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im März 2006.

Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen sind apothekenpflichtig.

Zul.-Nr. 43766.00.00

(*) In Lizenz der MEDA Pharma GmbH & Co. KG, 61352 Bad Homburg

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, damit Sie die belastende Pollenzeit besser überstehen, haben Sie in Ihrer Apotheke Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen bekommen. Nützliche Tipps gegen Ihre Beschwerden finden Sie in unserem "Heuschnupfen-Ratgeber". Diesen können Sie kostenlos anfordern bei *Bausch & Lomb/Dr. Mann Pharma, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin*. Sie können uns auch telefonisch (030) 33093-0, per Fax (030) 33093-399 oder E-Mail heuschnupfen@bausch.com erreichen.

Bei Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen handelt es sich um ein Antihistaminikum der 2. Generation, das heißt, es lindert rasch die Beschwerden - wie Rötung, Juckreiz und Tränen der Augen -, die bei einer Allergie am Auge auftreten, ohne müde zu machen.

Eine Allergie ist eine Überreaktion des körpereigenen Abwehrsystems auf körperfremde, eigentlich unschädliche Stoffe. Sie kann z.B. durch den Kontakt mit Blütenpollen, Hausstaubmilben oder Tierhaaren ausgelöst werden.

Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen blockieren die Effekte von Histamin und anderen entzündlich wirkenden Stoffen, die bei einer Allergie vermehrt freigesetzt werden. Dadurch wirken sie den Symptomen einer Bindehautentzündung entgegen.

Bausch & Lomb

Dr. Mann  Pharma
www.vividrin.de

PB 148D2/40

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen beachten?
3. Wie sind Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was sind Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen und wofür werden sie angewendet?

Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen sind ein Antiallergikum/Antihistaminikum. Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen werden angewendet zur Behandlung und Vorbeugung der Symptome der saisonalen allergisch bedingten Beschwerden der Augen (allergische Bindehautentzündung, sog. allergische Konjunktivitis, bei Heuschnupfen) bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren. (Saisonale Allergien sind zum Beispiel durch Pollen von Bäumen oder Gräsern ausgelöste Allergien, die zeitlich begrenzt auftreten.)

Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen werden außerdem angewendet zur Behandlung der Symptome der nicht-saisonalen (perennialen) allergisch bedingten Beschwerden der Augen (allergischer Bindehautentzündung, sog. allergische Konjunktivitis) bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren. (Nicht-saisonale Allergien sind zum Beispiel durch Hausstaub, Tierhaare oder Schimmelpilze ausgelöste Allergien, die das ganze Jahr über zeitlich unbegrenzt auftreten können.)

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen beachten?

Wann dürfen Sie Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen nicht anwenden?

Sie dürfen Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen nicht anwenden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem Wirkstoff Azelastinhydrochlorid, dem Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid oder einem anderen der sonstigen Bestandteile von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen reagieren.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen sollten bei saisonalen allergisch bedingten Beschwerden frühestens bei Kindern ab 4 Jahren angewendet werden, bei nicht-saisonalen (perennialen) allergisch bedingten Beschwerden frühestens bei Kindern ab 12 Jahren.

Was ist bei älteren Menschen zu berücksichtigen?

Für ältere Patienten sind keine besonderen Hinweise zu beachten.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen sind nicht zur Behandlung von Infektionen am Auge geeignet.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn sich die Symptome trotz Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen verschlimmern oder länger als 48 Stunden anhalten. Während der Behandlung mit Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen sollten keine Kontaktlinsen getragen werden. Weiche Kontaktlinsen werden durch das Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid verfärbt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel und Nahrungsmittel beeinflussen die Wirkung von Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen?

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und Nahrungsmitteln sind bisher nicht beobachtet worden.

Schwangerschaft und Stillzeit

In der Schwangerschaft sollten Sie vor der Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen den Arzt befragen.

Da der Wirkstoff in geringem Ausmaß in die Muttermilch ausgeschieden wird, sollten Sie Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen während der Stillzeit nicht anwenden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es ist unwahrscheinlich, dass die leichte vorübergehende Irritation, die nach Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen auftreten kann, zu einer stärkeren Beeinträchtigung der Sicht führt. Sollte es zu einer kurzzeitigen Beeinträchtigung der Sicht kommen, sollten Sie warten, bis diese vorüber ist, bevor Sie am Straßenverkehr teilnehmen oder Maschinen bedienen.

3. Wie sind Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen anzuwenden?

Wenden Sie Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Saisonale allergische Konjunktivitis:

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, sollen Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren 2-mal täglich je 1 Tropfen Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen in jedes Auge einträufeln. Falls erforderlich, kann diese Dosis auf 4-mal täglich je 1 Tropfen pro Auge erhöht werden.

Bei zu erwartendem Kontakt mit Allergenen können Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen auch vorbeugend angewendet werden.

Nicht-saisonale (perenniale) allergische Konjunktivitis:

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, sollen Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 2-mal täglich je 1 Tropfen Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen in jedes Auge einträufeln. Falls erforderlich, kann diese Dosis auf 4-mal täglich je 1 Tropfen pro Auge erhöht werden.

Wie sollten Sie Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen anwenden?

Nehmen Sie ein sauberes Papiertaschentuch und entfernen Sie die Tränenflüssigkeit vom unteren Lidrand (s. Abb. 1).

Schrauben Sie die Flasche auf.

Legen Sie den Kopf etwas zurück, ziehen Sie das Unterlid leicht vom Auge ab (s. Abb. 2) und träufeln Sie vorsichtig einen Tropfen in den Bindehautsack (s. Abb. 3).

Achten Sie dabei darauf, dass die Tropferspitze das Auge nicht berührt.

Lassen Sie das untere Augenlid wieder los und pressen Sie vom Augenwinkel aus leicht gegen die Nase (s. Abb. 4). Blinzeln Sie mehrmals langsam, um den Tropfen über den Augapfel zu verteilen. Entfernen Sie anschließend überschüssige Augentropfen.

Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Auge.



Abbildung 1




Abbildung 2




Abbildung 3



Abbildung 4

Wie lange sollten Sie Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen anwenden?

Sie sollten auch nach dem Abklingen der Beschwerden die Behandlung mit Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen so lange fortführen, wie Sie den Allergie auslösenden Substanzen (z. B. Pollen, Hausstaub) ausgesetzt sind.

Bei nicht-saisonal (perennial) allergischer Konjunktivitis sollte die ununterbrochene Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen auf maximal 6 Wochen begrenzt werden, weil die Sicherheit und Verträglichkeit des Arzneimittels in klinischen Studien nur bis zu 6 Wochen untersucht wurde.

Eine Anwendung über 6 Wochen hinaus darf auch bei saisonaler allergischen Konjunktivitis nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen angewendet haben, als Sie sollten

Nach Anwendung am Auge sind keine spezifischen Überdosierungsreaktionen bekannt und bei dieser Art der Anwendung auch nicht zu erwarten.

Wenn Sie die Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen vergessen haben

Sollten Sie einmal die Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen vergessen haben, sind keine speziellen Maßnahmen erforderlich. Setzen Sie die Therapie mit der gleichen Dosierung zum nächsten vorgesehenen Zeitpunkt fort. Bei Bedarf können Sie Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen auch zwischen zwei vorgesehenen Zeitpunkten anwenden.

Wenn Sie die Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen abbrechen

Die Behandlung mit Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen sollte nach Möglichkeit regelmäßig, bis zum Erreichen der Beschwerdefreiheit erfolgen.

Sollten Sie die Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen unterbrechen, obwohl Sie den Allergie auslösenden Substanzen noch ausgesetzt sind, so müssen Sie damit rechnen, dass sich die typischen allergischen Symptome erneut zeigen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel können Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden üblicherweise folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

Bedeutsame Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:

Gelegentlich kommt es unmittelbar nach Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen vorübergehend zu leichten Reizerscheinungen (z. B. Brennen, Jucken, Tränen) am Auge. Selten wird ein leicht bitterer, substanz eigener Geschmack wahrgenommen.

In sehr seltenen Fällen kann es zu allergischen Reaktionen kommen.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Wenn Sie von einer der oben genannten Nebenwirkungen betroffen sind, wenden Sie Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen nicht weiter an und suchen Sie Ihren Arzt möglichst umgehend auf.

Die genannten Nebenwirkungen klingen in der Regel rasch wieder ab. Besondere Gegenmaßnahmen sind deshalb nicht erforderlich.

Sollten Sie nach der Anwendung von Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen einen bitteren Geschmack verspüren, so können Sie diesem mit einem alkoholfreien Getränk (z. B. Saft, Wasser) entgegenwirken.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben ist.

5. Wie sind Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen aufzubewahren?

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren!

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel sowie auf dem Etikett der Flasche aufgedruckt. Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen sollten nach diesem Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden.

Aufbewahrungsbedingungen

Keine besonderen Hinweise erforderlich.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Verwenden Sie Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen nach Anbruch nicht länger als 4 Wochen.

6. Weitere Informationen

Was Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen enthalten:

Der Wirkstoff ist Azelastinhydrochlorid.

(1 ml Lösung enthält 0,5 mg Azelastinhydrochlorid. Ein Tropfen von ca. 30 µl enthält 0,015 mg Azelastinhydrochlorid.)

Die sonstigen Bestandteile sind: Benzalkoniumchlorid (Konservierungsmittel); Natriumedetat (Ph.Eur.); Hypromellose; Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph.Eur.); Natriumhydroxid und Wasser für Injektionszwecke.

Es sind Packungen mit 6 ml Augentropfen (Lösung) je Tropfflasche erhältlich.

Pharmazeutische Unternehmer: (*)

Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165 -173
13581 Berlin
Tel.: 030/33093-0
E-Mail: heuschnupfen@bausch.com
und Bausch & Lomb GmbH
Brunsbütteler Damm 165 -173
13581 Berlin
Tel.: 030/33093-0
E-Mail: heuschnupfen@bausch.com

Hersteller:

MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstraße 1
61352 Bad Homburg
Telefon: (06172) 888-01
Telefax: (06172) 888-2740

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im März 2006.

Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen sind apothekenpflichtig.

Zul.-Nr. 43766.00.00

(*) In Lizenz der MEDA Pharma GmbH & Co. KG, 61352 Bad Homburg

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, damit Sie die belastende Pollenzeit besser überstehen, haben Sie in Ihrer Apotheke Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen bekommen. Nützliche Tipps gegen Ihre Beschwerden finden Sie in unserem "Heuschnupfen-Ratgeber". Diesen können Sie kostenlos anfordern bei *Bausch & Lomb/Dr. Mann Pharma, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin*. Sie können uns auch telefonisch (030) 33093-0, per Fax (030) 33093-399 oder E-Mail heuschnupfen@bausch.com erreichen.

Bei Vividrin akut Azelastin antiallergischen Augentropfen handelt es sich um ein Antihistaminikum der 2. Generation, das heißt, es lindert rasch die Beschwerden - wie Rötung, Juckreiz und Tränen der Augen -, die bei einer Allergie am Auge auftreten, ohne müde zu machen.

Eine Allergie ist eine Überreaktion des körpereigenen Abwehrsystems auf körperfremde, eigentlich unschädliche Stoffe. Sie kann z.B. durch den Kontakt mit Blütenpollen, Hausstaubmilben oder Tierhaaren ausgelöst werden.

Vividrin akut Azelastin antiallergische Augentropfen blockieren die Effekte von Histamin und anderen entzündlich wirkenden Stoffen, die bei einer Allergie vermehrt freigesetzt werden. Dadurch wirken sie den Symptomen einer Bindehautentzündung entgegen.

Bausch & Lomb

Dr. Mann  Pharma
www.vividrin.de

PB 148D2/40