

Gebrauchsinformation

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.



Biodolor®

GLUTENFREI

1. Was ist Biodolor® und wofür wird es angewendet?

Biodolor® ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Schmerzen.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Kopfschmerzen.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Biodolor® beachten?

Wann dürfen Sie das Arzneimittel nicht anwenden?

Biodolor® dürfen Sie nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Primeln.

Was sollten Sie bei einer Selbstbehandlung beachten?

Bei Erbrechen, Seh- oder Bewußtseinsstörungen, sowie bei allen anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte Sie einen Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Welche anderen Medikamente beeinflussen die Wirkung des Arzneimittels?

Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?

Eine Beeinflussung der Wirkung des Arzneimittels durch andere Medikamente ist bisher nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 2 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 2 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren erfolgt die Anwendung nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt.

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Biodolor® daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Therapeuten ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist Biodolor® einzunehmen?

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen das Arzneimittel nicht anders verordnet wurde:

Wieviel sollten Sie von dem Arzneimittel einnehmen und wie oft sollten Sie es anwenden?

Sie sollten bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 1 Tablette einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 – 3 mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. Die Dosierung bei Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren erfolgt nach Anweisung des homöopathisch erfahrenen Arztes. Die Dosierung bei Kindern zwischen 6 und 12 Jahren erfolgt nach Anweisung des homöopathisch erfahrenen Arztes oder Heilpraktikers.

Wie lange sollten Sie das Arzneimittel einnehmen?

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

5. Wie ist Biodolor® aufzubewahren?

Bewahren Sie das Arzneimittel so auf, dass es für Kinder nicht zugänglich ist. Bitte verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach dem auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatum.

Nicht über 25 °C aufbewahren.

6. Weitere Informationen:

ZUSAMMENSETZUNG:

1 Tablette enthält: Wirkstoffe: Cyclamen purpurascens Trit. D 3 50,0 mg, Gelsemium sempervirens Trit. D 4 50,0 mg, Melilotus officinalis Trit. D 2 25,0 mg, Primula veris Trit. D 3 25,0 mg, Sanguinaria canadensis Trit. D 6 25,0 mg, Strychnos nux-vomica Trit. D 4 50,0 mg, Thea chinensis (HAB 34) Trit. D 3 [HAB, V. 4a, Urt. mit Ethanol 62 % (m/m)] 25,0 mg.

Bestandteile 1 – 7 über die letzte Stufe gemeinsam potenziert.

Sonstige Bestandteile: Calciumbehenat, Kartoffelstärke.

INHALT: 100 Tabletten zum Einnehmen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller ist das

Homöopathische Laboratorium, A. Pflüger GmbH & Co. KG, Röntgenstraße 4, D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Stand der Information: September 2011

Biodolor® ist ein schmerzlinderndes homöopathisches Komplexpräparat, das bei Kopfschmerzen Anwendung findet.

Wie entstehen Schmerzen?

Werden Nerven irritiert, gereizt oder geschädigt, reagiert der Körper mit Alarmzeichen und der Mensch empfindet Schmerzen.

Diese Alarmzeichen des Körpers sind zu hinterfragen!

Handelt es sich um Irritationen des Bewegungsapparates wie Wirbelfehlstellung oder ist der Schmerz Ausdruck von Organleiden oder ist die ständige Überforderung aus Alltag und Familie Auslöser der Schmerzen, insbesondere von Kopfschmerzen?

Schmerzen sind Sinneswahrnehmungen und werden je nach Naturell der Betroffenen sehr unterschiedlich empfunden und gewertet. Die Beschreibungen reichen von bohrend, ziehend, dumpf, stechend bis hin zu unerträglich. Dieser Leidensdruck wird häufig begleitet von Übelkeit, Schwindel, Geräusch- und Lichtempfindlichkeit.

Die Bestandteile von Biodolor® haben einen guten Bezug zu Kopfschmerzen verschiedenster Art und Ursache und können somit zur Linderung der Kopfschmerzen beitragen.

Homöopathisch. Natürlich. Wirksam.

Homöopathisches Laboratorium A. Pflüger GmbH & Co. KG
Röntgenstraße 4 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Tel. 0 52 42 / 94 72-0

**PFLÜGER**
HOMÖOPATHISCHE
ARZNEIMITTEL