

GEBRAUCHSINFORMATION

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Aciclovir Heumann Creme

Zusammensetzung

1 g Creme enthält:

als arzneilich wirksamen Bestandteil:

Aciclovir 50 mg;

als sonstige Bestandteile:

gereinigtes Wasser, Propylenglycol, weißes Vaseline, Paraffin, Macrogol 1.500, Glycerolmonostearat, Cetylalkohol, Dimeticon.

Darreichungsform und Inhalt

Aciclovir Heumann Creme ist in Originalpackungen mit 2 g (N1), 5 g (N1) und 20 g (4 x 5 g) (N3) Creme erhältlich.

Stoff- oder Indikationsgruppe/Wirkungsweise

Aciclovir hemmt das Wachstum von Viren und wird zur Behandlung von Lippenbläschen eingesetzt.

Hersteller und pharmazeutischer Unternehmer HEUMANN PHARMA

GmbH & Co. Generica KG

Südwestpark 50 · 90449 Nürnberg

Telefon/Telefax: 0700 4386 2667

www.heumann.de

Anwendungsgebiete

Zur lindernden Behandlung von Schmerzen und Juckreiz bei häufig wiederkehrenden Herpesinfektionen mit Bläschenbildung im Lippenbereich (rezidivierender Herpes labialis).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Aciclovir Heumann Creme nicht anwenden?

Sie dürfen Aciclovir Heumann Creme nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Aciclovir oder einen der sonstigen Bestandteile.

Aciclovir Heumann Creme darf nicht auf Schleimhäute (z. B. in der Mundhöhle, am Auge oder in der Scheide) aufgetragen werden, da sonst mit lokalen Reizerscheinungen zu rechnen ist.

Wann dürfen Sie Aciclovir Heumann Creme erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Im Folgenden wird beschrieben, wann Sie Aciclovir Heumann Creme nur unter bestimmten Bedingun-

gen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Sollte bei Ihnen eine schwere Störung der körpereigenen Immunabwehr vorliegen, sollten Sie Aciclovir Heumann Creme nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Was müssen Sie vor der Anwendung von Aciclovir Heumann Creme beachten?

Cetylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Für Aciclovir Heumann Creme sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Aciclovir Heumann Creme nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsverschriften, da Aciclovir Heumann Creme sonst nicht richtig wirken kann!

Wie viel von Aciclovir Heumann Creme und wie oft sollten Sie Aciclovir Heumann Creme anwenden?

Die Creme sollte 5-mal täglich, alle 4 Stunden tagsüber, dünn auf die betroffenen Hautbereiche aufgetragen werden.

Wie lange sollten Sie Aciclovir Heumann Creme anwenden?

Die Behandlungsdauer beträgt im Allgemeinen 5 Tage. Kommt es während der Behandlung zu einer Verschlechterung der Hauterscheinungen oder sind spätestens nach 10 Tagen Behandlungsdauer die Bläschen nicht verkrustet oder abgeheilt, so ist die Behandlung abzubrechen und ein Arzt aufzusuchen.

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt. Halten Sie diese Zeiten bitte auch dann ein, wenn Sie sich besser fühlen.

Wie und wann sollten Sie Aciclovir Heumann Creme anwenden?

Sie sollten Aciclovir Heumann Creme mit Hilfe eines Wattestäbchens auftragen, indem Sie dieses mit einer für die Größe der infizierten Hautbereiche notwendigen Menge bestreichen. Beim Auftragen sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht nur die sichtbaren Anzeichen des Herpes (Bläschen, Schwellung, Rötung) mit der Creme bedecken, sondern dass Sie auch angrenzende Bereiche in die Behandlung mit einbeziehen.

Falls Sie das Auftragen mit der Hand vornehmen, sollte diese vorher und nachher intensiv gereinigt werden, um eine zusätzliche Infektion der geschädigten Hautpartie (z. B. durch Bakterien) oder eine Übertragung der Viren auf noch nicht infizierte Schleimhaut- und Hautbereiche zu verhindern.

Besonderer Hinweis:

Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, sollte Aciclovir Heumann Creme bereits bei den ersten Anzeichen der Herpes-Erkrankung (Brennen, Jucken, Spannungsgefühl und Rötung) angewendet werden. Wenn die Hauterscheinungen bereits ausgeprägt sind und z. B. Bläschen- oder Krustenstadium erreicht haben, ist eine Behandlung mit Aciclovir Heumann Creme nicht mehr sinnvoll.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler **Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Aciclovir Heumann Creme angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?**

Sollten Sie eine Anwendung vergessen haben, setzen Sie bitte die Behandlung wie angegeben bzw. verordnet fort (tragen Sie die Creme nicht häufiger oder dicker auf).

Wenn Sie mehrere Anwendungen vergessen haben oder wenn Sie die Behandlung wegen auftretender Nebenwirkungen unterbrechen wollen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt, damit er mögliche Maßnahmen festlegen kann.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Aciclovir Heumann Creme auftreten?

Nach der Anwendung von Aciclovir Heumann Creme können vorübergehendes Brennen oder Stechen auf den behandelten Hautabschnitten auftreten.

Rötungen, Eintrocknung, Juckreiz und Abschupung der mit Aciclovir Heumann Creme behandelten Haut wurden gelegentlich beobachtet.

Selten wurde nach Anwendung von Aciclovir Heumann Creme vom Auftreten einer allergischen Hautreaktion (Kontaktdermatitis) berichtet. Wurden allergologische Untersuchungen durchgeführt, erwiesen sich in den meisten Fällen die Hilfsstoffe der Cremegrundlage und nicht der Wirkstoff Aciclovir als deren Ursache. Eine Kontaktdermatitis ist daran zu erkennen, dass die oben genannten Nebenwirkungen verstärkt auftreten und über die mit der Creme behandelten Hautabschnitte hinausgehen.

In solchen Fällen sprechen Sie bitte umgehend mit Ihrem Arzt

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die in dieser Packungsbeilage nicht aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf Faltschachtel und Tube aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Aciclovir Heumann Creme aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern!

Stand der Information:

Oktober 2004

HEUMANN

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Liebe Patientin, lieber Patient, Sie haben Aciclovir Heumann Creme, ein Arzneimittel mit dem bewährten Wirkstoff Aciclovir, erhalten.

Dieses Arzneimittel soll Ihnen helfen, schneller beschwerdefrei zu werden. Damit Aciclovir Heumann Creme seine Wirkung optimal entfalten kann, ist es wichtig, dass Sie sich an die Dosierungsanleitung in der Gebrauchsinformation und/oder die Angaben Ihres Arztes halten.

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker, die Ihnen gerne weiterhelfen.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung!

Vfw. Wichtige Information zur Entsorgung dieses Arzneimittels und seiner Verpackung

Die Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG hat sich dem Rücknahme- und Wertungssystem Vfw-REMEDICA angeschlossen. Wir bitten Sie deshalb, dieses Arzneimittel nicht dem Restmüll beizufügen, sondern es zusammen mit seiner Verpackung bei an Vfw-REMEDICA teilnehmenden Apotheken abzugeben.

Apothekenpflichtig (2 g Creme), bzw.
Verschreibungspflichtig (5 g, 20 g Creme)